



Что делать, если у ребенка аллергия на животных?

Никонова Виктория

врач-педиатр, к.м.н., старш.науч.сотр
заместитель главного врача ГБУЗ МО «МОКДЦД»




- Аллергические реакции возникают на специфические белки, которые в основном содержатся в коже, слюне и моче животных
- Выраженность аллергической реакции не зависит от длины шерсти животного.

Гипоаллергенных пород собак и кошек НЕ СУЩЕСТВУЕТ!

*Есть породы собак, не имеющие подшерстка и выделяющие меньше «аллергенной перхоти» (слущенного верхнего слоя кожи)



Бедлингтон-терьер



Бишон фризе



Китайская хохлатая



Мексиканская голая собака



Ирландский водяной спаниель



Португальская водяная



Керри-блю-терьер



Йоркширский терьер

Также:

- Ирландский мягкошерстный пшеничный терьер
- Пудель
- Мальтезе
- Шнауцер

* по данным



Породы, генетически выделяющие больше «перхоти»



Спрингер-спаниэль /
Кокер-спаниэль



Бассет



Немецкая овчарка



Вест хайленд уайт терьер



Такса



Золотистый ретривер/
лабрадор

Не всегда симптомы аллергии возникающие после контакта с собакой говорят об аллергии на животное!



У некоторых людей это симптомы аллергии на бытовую пыль (на клещей домашней пыли), т.к. максимальное количество клещей может быть на подстилке животного

Стирайте и меняйте регулярно подстилку у животного!

У кошек высокоаллергенной является слюна

Менее «аллергенные» для человека:



Русская голубая кошка



Сибирская кошка

Как и у собак, способность вызывать аллергию
не зависит от длины шерсти

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫХ КОШЕК НЕ БЫВАЕТ!

5 способов уменьшить проявления аллергии



1. **Держите домашних животных подальше от спальни**
2. **Играйте с животными на свежем воздухе**
3. **Мойте руки** после прикосновения к вашему питомцу
4. **Мойте собаку** минимум раз в неделю
5. **Избавьтесь от ковров** и ковровых изделий

Астма и тяжелые аллергические реакции -
это большая проблема!

К сожалению, часто единственное эффективное решение
проблемы аллергии - это найти питомцу **НОВЫЙ ДОМ**



**Чтобы полностью очистить ваш дом от аллергенов
животного, может понадобиться не менее
полугода, а иногда больше.**